

Показания к применению	Суточная доза	Средний курс терапии
<b>Цереброваскулярная патология</b>		начинают как можно раньше
ОНМК, острый период	20-50 мл	10-20 дней
ОНМК, восстановительный период	10-30 мл	20 дней
<b>Органические, метаболические и нейродегенеративные заболевания головного мозга</b>		
Дисциркуляторная энцефалопатия Болезнь Альцгеймера Сосудистая деменция	5-30 мл	20 дней, повторные курсы через каждые 3 месяца
<b>Травматические повреждения мозга</b>		
Черепно-мозговая травма Послеоперационная травма	10-50 мл	10-20 дней
<b>Неврологические нарушения у детей</b>		
Церебральный паралич Задержка умственного развития Аутизм Синдром дефицита внимания с гиперактивностью	0,1-0,3 мл на 1 кг массы тела	30 дней
<b>Психоорганический синдром</b>	10-30 мл	20 дней

**Церебролизин® в дозах от 10 до 50 мл** рекомендуют вводить путем медленных внутривенных инфузий. Соответствующие дозы Церебролизина® разводят равным объемом 0,9% раствора натрия хлорида, раствором Рингера или 5% раствором глюкозы. Введение раствора начинают сразу после его приготовления. Рекомендуемая продолжительность инфузии составляет от 15 до 60 мин.

**Низкодозовый режим:** Церебролизин® в дозе до 5 мл вводят внутривенным (в/в) или внутримышечным (в/м) способом без разведения. В дозе до 10 мл Церебролизин® рекомендуют вводить только внутривенным способом без разведения. При внутривенном введении длительность инфузии должна составлять не менее 3 минут. Введение Церебролизина® начинают немедленно после вскрытия ампулы.

**Микробиологическое загрязнение** Церебролизина® может начаться с момента вскрытия ампулы (в состав Церебролизина® входят пептиды и аминокислоты в водном растворе). Для сохранения стерильности раствора необходимо соблюдать особые меры предосторожности во время разведения и введения Церебролизина®. Используйте только одноразовые в/в катетеры и канюли. Перед использованием промойте в/в катетер и канюлю 0,9% раствором натрия хлорида.

**При инфузии** Церебролизин® нельзя смешивать со сбалансированными растворами аминокислот. Особое внимание следует обратить на возможные побочные эффекты при его использовании вместе с антидепрессантами или ингибиторами MAO. В таких случаях рекомендуют снизить дозу антидепрессанта. Витамины и сердечно-сосудистые средства могут быть назначены вместе с Церебролизином®, при этом лекарственные препараты нельзя смешивать в одном шприце.

**Церебролизин®** соединяет нейроны