

ІНСУЛЬТ

ЧМТ

ДЕМЕНЦІЯ

Ефекти раннього лікування ЧМТ

CAPTAIN — безпека та ефективність Церебролізину після черепно-мозкової травми зі ступенем тяжкості від середнього до важкого

Muresanu, Dafin F., et al., „Efficacy and safety of cerebrolysin in neurorecovery after moderate-severe traumatic brain injury: results from the CAPTAIN II trial.“ Neurological Sciences: 1-11

Ефективне лікування ЧМТ

- Ефекти раннього лікування
- Достовірне зниження депресії
- Покращення пам'яті та концентрації


Церебролізин[®]

Возз'єднує нейрони.
Надихає на життя.

Починайте лікування Церебролізином якнайшвидше після ЧМТ

Корисні ефекти вже на 10-й день

- Рання незалежність
- Пацієнти менше залежать від опікунів з самого початку
- Менший час перебування в стаціонарі



Назва: Ефективність та безпека Церебролізину після черепно-мозкової травми зі ступенем тяжкості від середнього до важкого:
Результати дослідження CAPTAIN II

Пацієнти: 80 в групі Церебролізину + 59 в групі плацебо = 139 пацієнтів

Лікування: Лікувальний цикл №1 — день 1–10-й: 50 мл на добу
Лікувальний цикл №2 — день 31–40-й: 10 мл на добу
Лікувальний цикл №3 — день 61–70-й: 10 мл на добу

Церебролізин® (CEREBROLYSIN®). Психостимулюючі та ноотропні препарати. Код АТХ N06ВХ. Розчин для ін'єкцій. 1 мл розчину містить 215,2 мг концентрату Церебролізину (пептидного препарату, що виробляється з мозку свиней). **Показання:** органічні, метаболічні порушення та нейродегенеративні захворювання головного мозку, насамперед хвороба Альцгеймера; ускладнення після інсульту; травматичні пошкодження головного мозку (стани після оперативного втручання на мозку, закриті черепно-мозкові травми, струс мозку). **Протипоказання:** підвищена чутливість до одного з компонентів препарату, епілепсія, тяжкі порушення функції нирок. **Побічні реакції.** Побічні реакції в зв'язку з терапією препаратом Церебролізин® відмічаються рідко (> 1/10000 – < 1/1000) або мають поодинокі випадки (< 1/10000). При дуже швидкому введенні можливі запаморочення, тремор, головний біль, відчуття жару, посилене потовиділення, свербіж, можливі макулопапульозні висипання, кропив'янка, почервоніння шкіри, задишка та біль у грудях. **Фармакологічні властивості.** Церебролізин® стимулює диференціацію клітин і активує механізми захисту та відновлення, безпосередньо впливає на нейрональну і синаптичну пластичність, що сприяє поліпшенню когнітивних та рухових функцій. **Спосіб застосування та дози.** Препарат вводять внутрішньовенно або внутрішньом'язово. Тривалість курсу лікування та оптимальна щоденна доза залежать від стану хворого, патології, яку він має, та його віку. Частіше рекомендована тривалість курсу лікування становить 10–20 днів. Ефективність терапії зазвичай зростає при проведенні повторних курсів. Лікування продовжують доти, доки спостерігається поліпшення стану пацієнта внаслідок терапії. **Категорія відпуску.** За рецептом. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. **Інформація для фахівців у галузі охорони здоров'я.** Р.п. МОЗ України: № UA/9989/01/01, дійсне від 18.03.2014.